

RICHIESTA DI ESAME RADIOLOGICO

Inviare la richiesta prima dell'appuntamento

Cognome: _____ Nome: _____ Data di nascita: _____ Tel.: _____ Indirizzo: _____	Iscritto per: Data: _____ Ora: _____	Ambulante <input type="checkbox"/> Degente <input type="checkbox"/> Malattia <input type="checkbox"/> Infortunio <input type="checkbox"/>
Indagine richiesta	<i>Preparazione e controindicazioni vedi retro</i>	
	Ultime mestruazioni:	
	Allergia a mezzo di contrasto Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Dati clinici	Creatinina: _____ Quick: _____ Tc: _____	
	Copia referto a:	
	Medico richiedente	

Prende attualmente uno di questi farmaci?

METFORMINA (METFIN) Si No

IN CASO DI RICHIESTA TAC E RISPOSTA «SI» NON SOMMINISTRARE IL GIORNO DELL'ESAME!

Interleukina2 (IL-2, Proleukin®, Aldesleukin) Si No

AINS (Mephadolor, Ponstan, Volterene, Brufen, Ibuprofene, ecc) Si No

Aminoglicosidi (Tobramicina, Neomicina, Streptomina, Gentamicina, Vancomicina) Si No

Beta-Bloccanti (Inderal, Bilol, Belok-Zok, Sotalex, ecc) Si No

Antiaggreganti/Anticoagulanti (Aspirina Cardio, Plavix, Xarelto, Marcoumar, Sintrom) Si No

INVIARE IL PAZIENTE CON LE RADIOGRAFIE PRECEDENTI

Preparazione agli esami radiologici

Risonanza magnetica

Controindicazioni assolute:

- Portatore di pace-maker o altri impianti elettronici
- Clip vascolari cerebrali di impianto non recente (evtl. chiedere al neurochirurgo)

Controindicazioni relative:

- Corpi estranei metallici specialmente vicino agli occhi: (eventualmente prima eseguire radiografia)
- Protesi valvolari cardiache (chiedere se compatibili)
- Gravidanza nel primo trimestre
- Protesi cocleari

Attenzione:

- Eventuali disturbi durante l'esame possono essere causati da protesi ortopediche, materiale osteosintetico, trucco, tatuaggi
- Allattamento: in caso di necessità di mezzo di contrasto intravenoso consigliamo di discutere il procedimento con il radiologo
- Claustrofobia: abbiamo diversi metodi per tranquillizzare i pazienti, ultima ratio: 1mg Dormicum spray nasale direttamente prima dell'esame. In tal caso il paziente deve essere accompagnato e non può guidare. Per favore segnalare eventuali controindicazioni al Midazolam.

Tomografia assiale computerizzata

- Per esame con mezzo di contrasto endovenoso indicare sempre il valore attuale della creatinina
- Diggiuno di 4 ore in previsione di iniezione di mezzo di contrasto
- Per gli esami addominali può essere necessaria l'assunzione di mezzo di contrasto che è da bere 1-2ore prima dell'esame, a casa o nel reparto di radiologia

Sonografia addominale

- Diggiuno da almeno 4 ore, (non fumare) eventualmente bere solo acqua
- Vescica urinaria piena

Biopsie/Infiltrazioni

- Valori attuali di Quick e Trombociti
- Sospendere aspirina 5 giorni prima dell'esame, anticoagulante fino a valori di quick sopra il 60%

Clisma opaco

- 2 giorni precedenti l'esame: alla sera 1 flacone X-Prep con 3 bicchieri d'acqua
- Il giorno precedente l'esame: colazione, pranzo normale, dopo pranzo bere lentamente 3 litri di Isocolan
- Il giorno dell'esame: digiuno